

Anticoncepción de emergencia

ANTICONCEPCIÓN de emergencia

¿Qué hacer cuando falla el preservativo?

Si has tenido algún problema con el **CONDÓN**, o si no has usado algún método anticonceptivo, acude en el plazo de las 72 horas siguientes (cuanto antes mejor) a un Centro de Salud Sexual y Reproductiva (CSSR), para evitar un posible embarazo.

Tienes tiempo suficiente para acudir a un CSSR por lo que únicamente debes recurrir a un Servicio de Urgencias en caso extremo.

Si no sabes dónde se encuentra el más próximo, puedes informarte en los teléfonos gratuitos.



No olvides que la anti-concepción de emergencia, debe utilizarse únicamente de manera excepcional. El uso del **preservativo de forma regular**, proporciona una eficacia superior a la de la anticoncepción de emergencia y previene las infecciones de transmisión sexual.



La anticoncepción de emergencia es más efectiva **cuanto antes se tome**, y en cualquier caso el inicio del tratamiento debe comenzar antes de que pasen 72 horas desde la relación sexual en la que se ha producido algún problema. Si has pasado las 72 h, consúltalo con el CSSR.



La toma de esta píldora **no supone protección** para las relaciones sexuales sucesivas. Tampoco protege frente al SIDA u otras infecciones de transmisión sexual. **Utiliza otro método anticonceptivo de manera habitual.**



Cuando acudas al CSSR indica el motivo de la visita y se te atenderá rápidamente y con absoluta confidencialidad. **Aporta información** sobre la fecha de la última regla, sobre el tiempo que tardas habitualmente en tener las reglas, y sobre posibles infecciones que sufras o hayas padecido.

No tomes medicación por tu cuenta.

Acude a un CSSR.

TELÉFONOS DE INFORMACIÓN:

INFOSALUD

900 161 161

TELÉFONO JOVEN DE LA SEXUALIDAD

902 25 20 20

MÁS VALE EL USO DEL PRESERVATIVO EN EL DÍA QUE LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA.


www.san.gva.es

ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE VALÈNCIA

Diseño: monica martinez_ paramonic@hotmail.com

Depósito Legal: V-2766-2005

Imprime: Kolor Litógrafos, S.L. Tel. 96 132 40 41



Emergency contraception

EMERGENCY contraception

What happens when the condom fails?

If you've had problems with the **CONDOM** or if you had unprotected sex, go to one of the Family Planning Centres within 72 hours or sooner, if you want to avoid getting pregnant.

If you act quickly, you will get all the medical attention you need at one of the CSSRs. Go to hospital casualties only in an emergency.

If you don't know where to find the nearest CSSR, use one of the freephones available.



Don't forget that emergency contraception is only to be used in an emergency. **Regular use of a condom** is much more effective and it also protects you from sexually transmitted diseases.



Emergency contraception is **more effective the sooner it is taken**. Treatment must begin at least 72 hours after sexual relations. If you wait longer, ask for advice at a CSSR.



Taking the post-coital pill **does not protect you** if you have sex afterwards. Neither does it protect you against AIDS or other sexually transmitted diseases. **Use contraceptive protection regularly.**



When attending a CSSR, your case will be dealt with in confidence. **Give information** about the date of your last period, the regularity of your periods, or infections you have or have had.

Do not take drugs without consulting a doctor.

Go to a CSSR.

FOR FURTHER INFORMATION PHONE:

INFOSALUD
900 161 161
SEXUALIDAD JOVEN
902 25 20 20

**SAFE SEX IS BETTER THAN EMERGENCY
CONTRACEPTION**

www.san.gva.es