

Si eres personal sanitari...

1 de diciembre, Dia Mundial de la Sida.


900 111 000

DET N EL SIDA. STOP SIDA. PARA LA SIDA
STOP AIDS. ATURA LA SIDA. GELDIARAZI HIESA. DET N A SIDA.

ОСТАНОВИТЕ СПИД. 拒绝爱滋. لنوقف الإيدز.



www.msps.es



...el teu paper en el diagnòstic precoç del VIH és molt important.

RECORDA

Quasi un 50% de les infeccions per VIH es diagnostiquen massa tard (<350 CD4).

Convé oferir una prova de VIH a les persones que:

- Estiguen embarassades o que prompte ho estaran.
- Hagen tingut alguna infecció de transmissió sexual, tuberculosi o hepatitis vírica.
- Tinguen parella estable i vulguen deixar d'usar preservatiu amb la parella.
- Hagen mantingut relacions sexuals amb penetració (anal, vaginal i oral amb ejaculació) sense preservatiu amb algú que té VIH o de qui desconeixen el seroestatus.
- Hagen compartit material per a injectar-se drogues.
- Tinguen una patologia indicativa de possible infecció per VIH.

**EN GENERAL, VAL MÉS FER LA PROVA DE VIH A
QUALSEVOL PERSONA QUE SOL·LICITE FER-SE'N UNA**

Recomana la prova. Para la sida.